



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**DECISION D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT
PHYTOPHARMACEUTIQUE
AU TITRE DE L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT (CE) N°1107/2009**

Vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et en particulier son article 53 relatif aux autorisations délivrées à titre de dérogation en situation d'urgence phytosanitaire pour une période n'excédant pas cent vingt jours,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

Vu la demande de la FREDON Occitanie,

Considérant les difficultés de gestion des larves du longicornes sur les mûriers d'ornement et d'ombrage,

Considérant l'insuffisance des moyens disponibles pour une maîtrise correcte de la situation phytosanitaire,

L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ci-après est délivrée en France du 10/09/2026 au 08/01/2027 selon les dispositions précisées dans la présente décision.

1- Informations générales sur le produit

Nom commercial	REVIVE II
Numéro d'AMM	2180226
Seconds noms commerciaux	ARETOR
Substance(s) active(s)	Émamectine benzoate
Concentration de la substance(s) active(s)	95 g/L
Mentions de dangers du produit	H302 : Nocif en cas d'ingestion H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Titulaire de l'autorisation	SYGENTA France SAS 1 avenue des Près CS 10537 78280 Guyancourt Cedex



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

2- Conditions d'emploi

Dispositions générales	SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
Protection de l'opérateur et du travailleur	Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur : - l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ; - le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ; - les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation. <u>Protection de l'opérateur</u> Dans le cadre d'une application à l'aide d'un système à injection : Pendant la manipulation du produit (fixation au système d'injection, sans transvasement) : - Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) ; - EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ; - Lunettes de sécurité ou écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3). Pendant l'application : - Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique ; - EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ; - Lunettes de sécurité ou écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3). Pendant le nettoyage du système d'injection : - Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) ; - EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

	- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ; - Lunettes de sécurité ou écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3).
Protection des abeilles	SPe 8 : Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs : - Ne pas utiliser en présence d'abeilles ; - Ne pas appliquer durant toute la période de floraison ; - Ne pas appliquer pendant les périodes de production d'exsudats - Supprimer les inflorescences au moins un an après l'arrêt du traitement afin de limiter les risques pour les pollinisateurs (par exemple par taille de l'arbre pendant l'hiver à la suite de l'injection
Conditions particulières d'utilisation produit	L'utilisation de ce produit dans les conditions prévues par la présente autorisation est strictement réservée à des applicateurs professionnels disposant d'un agrément pour l'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, spécialement formés à la technique d'endothérapie par injection et équipés du matériel d'injection du produit sous pression contrôlée. Uniquement dans les communes listées par arrêté préfectoral définissant le périmètre de la zone infestée pour la lutte contre <i>Xylotrechus chinensis</i>. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du service régional de l'alimentation de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Occitanie. Éliminer les parties traitées mortes afin d'éviter une éventuelle dispersion dans l'environnement à partir du végétal traité.



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

3- Usage(s) autorisé(s)

Code de l'usage	Libellé(s) de(s) usage(s)	Autorisé(s) uniquement sur la(es) culture(s) suivante(s)	Dose maximale d'emploi par application	Nombre maximum d'application(s) par an et intervalle(s) d'application(s)	Stade(s) d'application (BBCH)	Délai avant récolte
14053106	Arbres et Arbustes* Trt Part.Aer. Insectes xylophages et sous-corticaux	Mûriers d'ornement et d'ombrage, dont mûrier à feuilles de platane (<i>Morus kagayamæ</i>) <i>Xylotrechus chinensis</i>	Traitement par endothérapie (injection à la dose de 1,6 ml/cm de diamètre de tronc – le tronc ayant un diamètre d'au moins 20 cm mesuré à 1,30 m du sol)	1 application tous les 2 ans	Stades larvaires actifs (automne)	/

Vous disposez d'un délai de deux mois pour contester la présente décision, devant les juridictions administratives.

Date : le 08/09/2026

Pour la Ministre et par délégation

La Directrice générale adjointe de l'alimentation

Marie-
Christine
LE GAL ID

Signature
numérique
de Marie-
Christine LE
GAL ID